







# 2010

# Vacunas recomendadas para bebés

 <b>al nacer</b>	HepB		
 <b>2 meses</b>	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 1-2 meses		
 <b>4 meses</b>	DTaP + PCV + Hib + Polio + RV		
 <b>6 meses</b>	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV 6-18 meses*		(Influenza) 6 meses a 18 años* estacional** 2009 H1N1***
 <b>12 meses</b>	MMR + PCV + Hib + Varicela + HepA 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-23 meses*		(Influenza) 6 meses a 18 años* estacional** 2009 H1N1***
 <b>15 meses</b>	DTaP 15-18 meses*		(Influenza) 6 meses a 18 años* estacional** 2009 H1N1***

### Descripción de las vacunas:

HepB: protege contra la infección por el virus de la hepatitis B

DTaP: protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina

Hib: protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

PCV: protege contra la infección neumocócica

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV

RV: protege contra las infecciones causadas por el rotavirus

Influenza: protege contra la influenza (gripe)

MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)

Varicela: protege contra la varicela

HepA: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

**NOTA:** Si le falta una vacuna, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de sus niños.

\* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.

\*\* La influenza es una vacuna estacional. Todos los niños de 6 meses a 18 años de edad deben recibir la vacuna contra la influenza cada año. Aquellos que reciben esta vacuna por primera vez deben recibir dos dosis con un intervalo de 4 semanas. Aquellos que reciban una dosis en la primera temporada, deben recibir dos dosis en la próxima temporada.

\*\*\* Además de la vacuna contra la influenza estacional, se recomienda que los niños también reciban la vacuna contra la influenza 2009 H1N1. Los niños menores de diez años deben recibir dos dosis de esta vacuna con un intervalo de aproximadamente 1 mes.

Para más información, llame gratis al **1-800-232-4636**

o visite [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines)

Los calendarios de vacunación recomendados para personas de 0-18 años de edad están aprobados por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (<http://www.cdc.gov/vaccines/recs/acip>), la Academia Americana de Pediatría (<http://www.aap.org>) y la Academia Americana de Médicos de Familia (<http://www.aafp.org>).